



Paciente: _____

VÉSPERA DO EXAME (DATA): ____/____/20____**Almoço:** Normal - **Jantar:** Dieta Líquida (Caldo de Sopa Caseiro ou Sopa Vono)**18h00** - tomar 04 comprimidos de Dulcolax ou Bisalax

Tomar bastante líquido para ajudar o intestino a funcionar: Suco, chá, água, água de côco, gelatina e gatorade (Sabores limão ou abacaxi). Caldo de sopa caseiro, coado em peneira fina ou sopa vono.

21h00 - Tomar 01 Sache de Pico Prep Conforme orientado abaixo:**1.**
Encha um copo com 150 ml de água fria.**2.**
Despeje o conteúdo de um sachê dentro do copo.**3.**
Mexe por 2 a 3 minutos. Se a solução leitosa ficar quente, espere esfriar para tomar.**4.**
Beba, pelo menos 5 copos de 250ml de água ou outros líquidos claros, sem resíduos, nas horas seguintes.**22h00** - Tomar 01 Sache de Pico Prep conforme orientado anteriormente.**DIA DO EXAME:** _____**Horário:** _____:**06H30** - Tomar 02 cápsulas de Dramin 50 mg. Ou NalsicalmB6 50mg.**07h00** - Tomar + 01 Sache de Pico Prep conforme orientado anteriormente**09h00** - Tomar + 01 Sache de Pico Prep conforme orientado anteriormente**JEJUM TOTAL APÓS AS 10:00HORAS (NÃO TOMAR ÁGUA)**

Não tomar café da manhã, leite e derivados.

Telefone: (17) 3302-4780 / Whats app: (17) 99281-4892

Obs: Tomar 1 cápsula de Dramin Capsugel 25 mg a cada 06h00 se apresentar náuseas ou vômitos após o exame.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 1 - Obedecer jejum de 08 horas.
- 2 - Não interromper medicações de uso diário. Tomar no dia do exame cedo os remédios de rotina com pouca água (suficiente apenas para engolir comprimidos).
- 3 - Se usar remédios para afinar o sangue (AAS, Clopidogrel, Marcoumar, Marevan, etc.), ou medicações para diabetes, comunicar o médico que receitou a medicação para discutir a possibilidade de suspensão ou readequação da medicação antes do exame.
- 4 - Remover esmaltes coloridos, brincos, relógios e objetos metálicos.
- 5 - Confirmar se a guia do convênio está autorizada.
- 6 - É imprescindível trazer acompanhante no dia do exame.
- 7 - Caso faça uso de VICTOZA ou SAXENDA, SUSPENDER medicação 72h antes do exame e obedecer jejum de 12h.
- 8 - Caso faça uso de OZEMPIC, SUSPENDER uso 10 dias antes do exame e obedecer jejum de 12h.
- 9 - Caso faça uso das medicações acima para controle de diabetes, converse com seu médico sobre as adequações de uso pré exame descritas acima.
- 10 - LACTANTES: Colher o leite antes do exame. Após o exame, aguardar 06 horas para amamentar novamente.
- 11 - Pacientes com peso SUPERIOR a 140kg, agendar consulta pré anestésica e realizar exame no Hospital Beneficência Portuguesa com a Dra. Nathalia Guarnetti

OBS.:O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES ACIMA DESCRITAS PODERÁ IMPLICAR EM REMARCAÇÃO DO EXAME.**Dr. Luiz Gustavo de Quadros**
CRM 125.610**Dra. Fernanda Azor**
CRM 161.405